


環境資料第37051号

令和6年度

水生生物調査結果報告書  
(東京都内湾)



令和8年3月  
東京都環境局

## 表紙の絵

### 左：カラシラサギ（葛西人工渚、令和6年8月）

朝鮮半島と中国南東部で繁殖する。日本には稀な旅鳥として海岸、干潟、河口、水田等に渡来する。全身が白色で脚が黒く、足指が黄色でコサギによく似るが、夏羽では嘴が黄色で後頭部に多数の冠羽がある点で識別できる。冬羽の嘴は黒色で冠羽がなくなるので、コサギに酷似する。浅瀬を活発に走り周り、魚類等を捕食する。令和6年度は、葛西人工渚で2羽が観察された。環境省レッドリストでは準絶滅危惧(NT)。

### 右：シラウオ（葛西人工渚、令和6年6月）

イシカワシラウオとは、尾柄の上下に1対の黒点がないこと、本種の方が、吻が長い事で識別できる。汽水域で一生涯を過ごす年魚で、春季に陸水域の砂礫底で産卵する。東京では多摩川河口から江戸川河口にかけて漁獲されていたが、1960年代から1970年代に絶滅したと考えられていた。2021年以降、多摩川河口に出現し、産卵も確認されている。令和5年度調査で初めて葛西人工渚で出現し、令和6年度調査においても出現した。

# 東京都内湾の水生生物生息状況（令和6年度）



イラストはイメージです。必ずしも高次の生物と食物連鎖の関係があるとは限りません。

東京都内湾には、河口域や干潟域、河口と干潟をつなぐヨシ原、浅海部、内湾部等様々な環境があり、環境に応じて、様々な生き物が生息しています。

環境局では、昭和 61 年から環境把握の一環として水生生物調査を実施してきました。

令和6年度には、次の種類数が確認されました。

鳥類調査	：カワウ、カモ類等	59種
成魚調査※	：テンジクダイ等	16種
稚魚調査	：エドハゼ、ピリンゴ等	43種
付着動物調査	：イワフジツボ等	63種
底生生物調査	：アサリ等	65種

※成魚調査は、小型底引網を使用した底生魚類を対象とした調査です。



生き物には、海をきれいにする働きがあります。

わたしたちの出した汚れ(有機物)は、貝、カニ、ゴカイなどの生物のエサとなります。それらを鳥や魚等が捕え、移動したり漁獲されたりすることで系外に排出されます。

また、微生物は、海底の汚れ(有機物)を酸化して窒素を取り除きます(脱窒作用)。

さらに、干潟では、二枚貝が海水を取り込んだ際にプランクトンなどの懸濁物を取り除き(ろ過)、海をきれいにしています。

一方、東京都内湾の底層では、夏季に酸素濃度が低下する現象が発生しています。下図は、成魚調査の出現個体数と下層の溶存酸素量(DO)の関係を示したものです。9月の調査では下層(海底から1m上部)の溶存酸素量が2mg/L未滿となることが多く、出現個体数は極端に減少しています。貧酸素水塊の存在が生物に与える影響は大きいのです。



調査地点（赤字の地点については巻頭3～5ページで紹介しています。）



内湾部 4地点

(St.6、St.22、St.25、St.35)

浅海部 2地点

(St.10、三枚洲)

河口部 1地点

(St.31)

干潟部 4地点

(葛西人工渚、お台場海浜公園、森ヶ崎の鼻、多摩川河口干潟)

護岸部 2地点

(中央防波堤外側(その2)東側、13号地船着場)

※調査地点の詳細については、本文2、3ページ参照


# お台場海浜公園 ～水生生物にも人気のスポット～

実施調査：鳥類、稚魚



お台場はペリー来航時に砲台を置いた場所で、今でも二つの台場が残っています。一時期は貯木場として使用されていましたが、その後、海浜公園として整備されました。現在、近くには複合商業施設やテレビ局本社があり、夜には多くの屋形船が停泊し、東京の観光スポットとして賑わっています。人工砂浜も整備され、誰でも海のすぐ近くまで近づくことができます。

## 調査位置図



## 鳥類調査

第六台場、鳥の島の樹上でカワウが繁殖、サギ類が休息。



カワウ 5月

トビ、ノスリ、ハヤブサが飛翔、採餌。



ハヤブサ 5月

スズカモ等のカモ類が休息。



スズカモ 1月

砂浜周辺でユリカモメが採餌、休息。




ユリカモメ 1月


## 稚魚調査

スズキの仔魚が見られた。内湾の干潟域や人工海浜でハゼ科の稚魚や甲殻類を食べ、急速に成長する。

スズキ 2月



ヒリンゴ 6月




マハゼと並ぶ東京湾を代表するハゼの仲間。6月に最も多く出現した。

イシカワシラウオ 10月



本調査では5年ぶり（令和元年に葛西で出現）、お台場においては初出現となった。

クロサギ 10月



砂底域に生息する。仔稚魚の群れは漁港でも確認されるが、東京湾奥ではあまり見られない。

# 葛西人工渚（東なぎさ） ～水生生物の楽園～

実施調査：鳥類、稚魚



葛西人工渚は、葛西海浜公園に造成された人工の干潟です。2つの干潟（西なぎさ、東なぎさ）から成っています。西なぎさには橋が掛けられ、人の立入りが可能となっており、近年は海水浴体験イベントが実施され話題となっています。一方、東なぎさは環境保全ゾーンとなり、一般の立入りが禁止され、鳥をはじめとした水生生物の楽園となっています。

## 調査位置図



## 鳥類調査

### ①エリア

干潟ではシロチドリ、ハマシギなどのシギ・チドリ類、サギ類が採餌、休息



シロチドリ 1月



ハマシギ 1月



ダイシャクシギ 8月

### ②エリア

干潟の水際で、カワウ、サギ類、シギ・チドリ類、カモメ類が採餌・休息



カラシラサギ 8月



カワウ 1月

### ④エリア

護岸でカワウ、ウミウ、サギ類、クロツラヘラサギが休息



クロツラヘラサギ 1月



ウミウ 1月

### ③エリア(調査範囲外)

スズガモ、カイツブリ、ハジロカイツブリが海上で休息(1月)



## 稚魚調査

エドハゼ 5月



マハゼ 6月



コノシロ 6月



シラウオ6月



5、6月は、多様なハゼ科魚類、コノシロ、ボラ、クロダイ等の海水魚の稚魚が多く出現した。


昨年度調査に続き本年度も出現した。

# 森ヶ崎の鼻 ～埋め立て地に囲まれた干潟～

実施調査：鳥類、稚魚、底生生物

森ヶ崎の鼻とは、羽田空港の北西の運河域に位置する約 15ha の干潟のことです。干潮時には、くの字型の干潟が干出します。京浜島緑道公園等から眺めることが出来ませんが、一般の立入りはできません。すぐ脇には東京モノレールが走っています。また、隣接する森ヶ崎水再生センターの屋上には、NPO 法人等により守られたコアジサシの人工営巣地があります。

## 調査位置図



## 鳥類調査

②エリア 干潟の高い位置でカワウ、サギ類が休息。干潟が干出すると、サギ類、シギ・チドリ類、カモメ類が採餌、休息



③エリア 護岸ではカモ類等が採餌、休息



①エリア  
コアジサシ、ミサゴが飛翔。



## 稚魚調査

クロダイ 5月



チクゼンハゼ 6月



ウグイ属 8月



令和 5 年度まで北東 1.5km に位置している城南大橋で、調査を行っていたが、令和 6 年度から安定した干潟が形成されている森ヶ崎の鼻に調査地点を変更した。

## 底生生物調査

チロリ属 6月



ムロミスナウミナフシ 6月



ヤマトシジミ 8月



夏季においても、ヤマトシジミ、ホトトギスガイ等の二枚貝が見られた。ムロミスナウミナフシは春夏とも見られた。干潟であるため、夏季の貧酸素の影響は少ないためと思われる。

## 稚魚調査（本文 14 ページ）

干潟・浅場は、魚の「ゆりかご」と例えられ、たくさんの稚魚が育つ場所となっています。葛西人工渚（東なぎさ）、お台場海浜公園及び森ヶ崎の鼻の干潟で小型地引網を引き、稚魚を中心に生息する魚類を調査しました（調査は、原則として偶数月に実施）。



種類数・個体数は魚類のみの数値

### 葛西人工渚（東なぎさ）

5月 11種、4,524個体



8月 12種、155個体




12月 4種、12個体



### お台場海浜公園

5月 11種、1,530個体



8月 9種、346個体



12月 5種、37個体



### 森ヶ崎の鼻

5月 8種、1,140個体




8月 14種、505個体



12月 1種、2個体





### 稚魚調査（小型地引網）で採集された代表種

種名	生態情報	図・写真
マハゼ	東京では最も大きくなるハゼ。春先、稚魚が河口付近の干潟に現れ、成長するにつれて色々な場所へ散らばっていく。河口や内湾ではU字型の深い穴を掘って産卵する。	 <p>東京都内湾の代表的な底生魚である。稚魚調査で確認されるマハゼは、10 cm ほどの個体が主であるが、育つと全長は 30 cm 程度となる。秋から冬にかけて最も人気な釣りの対象種</p>

種名	生態情報	図・写真
ピリンゴ	泥底から砂泥底に住む。河口部に泥底域が発達しているところに多い。 岸辺近くの泥底に穴を掘るか、アナジャコやゴカイなど、他の動物が掘った穴を利用して巣を造り、巣穴の壁面に雌が産卵した後ふ化まで卵を守る。ふ化仔魚は一旦海に下り、しばらくして川へ遡上する。	寿命は2～3年であるが、1年で成熟して産卵後に死亡する個体も多い。全長は6cmほど  お台場海浜公園 5月
エドハゼ	自然環境が保たれている河川の河口域に生息する。砂泥底を好み、スナモグリ類やアナジャコ類が掘った巣穴を使って暮らしている。主に小型甲殻類を食べる。特に、葛西人工渚で多く出現する。	 森ヶ崎の鼻 5月
ボラ	出世魚で、小さいものから順に、ハク、オボコ、イナ、ボラ、トドと呼ばれる。卵巣を加工したものはカラスミと呼ばれ、珍重されている。 都内河川の下流部から内湾に広く分布している。泥底の有機物などを餌とする。	 森ヶ崎の鼻5月 海面で飛び跳ねる。お台場海浜公園で跳ねている魚を見かけた場合、その多くはボラである。成魚の全長は60cm程度
スズキ	東京湾を代表する魚。河口の干潟などでは、春先、数cmの稚魚が多く現れる。東京湾を広く回遊し、都心近くの運河でも見られる。河口部から内湾に広く分布しており、ゴカイ類、甲殻類、小魚などをエサとする。	 小型のものは、体に黒っぽい斑点がある 成長すると全長は50～90cm程度になる。

### 魚類調査において確認された魚類以外の生物の代表種


干潟の地引網調査では、魚類の他に、甲殻類、アミ類や二枚貝などが採集されます。それらは稚魚などのエサとして重要な役割を持っています。

種名	生態情報	写真
シラタエビ	触角が青いことが特徴のエビ。額角の基部が盛り上がることで、スジエビ類と区別ができる。汽水域を主な生息場とし、干潟にもよく出現する。成熟した個体では、体側に青色斑が現れることが多い。	葛西人工渚 5月 
二ホンイサザアミ	汽水域に生息するアミの仲間である(エビの仲間ではない)。魚類等の餌となり、食物連鎖において植物プランクトン等生産者のエネルギーを上位の消費者に渡す重要な役割を果たしている。佃煮や飼料としても利用される。	森ヶ崎の鼻 5月 

## 成魚調査（本文 58 ページ）

底引網を使って、海底に生息する魚類を調査しました。夏場、海底の酸素濃度が低くなる期間には、魚類の減少が顕著に表れます（巻頭 1 ページ参照）。

東京都内湾で最も沖合のSt.35、中心にあるSt.25、千葉県側のSt.22、浦安沖の浅海部のSt.10の4地点で5月、9月、11月及び2月に調査を行いました。ここでは、St.25についてご紹介します。



成魚調査イメージ（作図：東京都環境科学研究所 安藤）

### St.25（魚類以外も含む）

5月 30種、956個体 下層 DO 2.7mg/L



9月 0種、0個体 下層 DO 0.7mg/L



11月 15種、802個体 下層 DO 3.8mg/L



2月 29種、2677個体 下層 DO 7.6mg/L



下層 DO（溶存酸素濃度）が低くなる夏場では、生物がほとんど確認できなくなります。酸素濃度が回復に向かう秋口から徐々に生物が戻り始めます。しかし、次の夏にはまた生物が生息できなくなる環境が発生するということが、現在の東京湾の大きな課題となっています。

成魚調査(ビームトロール)で採集された代表種（魚類以外も含む。）

種名	生態情報	図
テンジクダイ	内湾から水深100mくらいまでの砂泥底にすむ。 夜行性で、7~8月頃産卵する。 雄が口の中に卵の塊を含んで守る。 海底の小動物をエサとする。	 <p>目が大きい</p>  <p>St.25 11月</p> <p>全長は9cm程度</p>
ハタタテヌメリ	内湾の砂泥底にすむ。雄と雌とで模様が異なる。雄は尾びれが長くて糸状に伸びる。粘液を出すのでヌルヌルする。ゴカイ類や二枚貝を餌とする。食用になる。	 <p>St.25 2月</p>
マコガレイ	水深100m以浅にすむ。イシガレイと異なり、成魚になると浅瀬では見られない。産卵期は冬で、東京湾では40cm以上のものも出現する。	 <p>St.35 5月</p>
アカエイ	東京湾で最も普通に見られるエイの仲間。甲殻類や多毛類等を食べる。尾部にノコギリ状の棘（毒針）を持ち、刺されると危険。	 <p>St.10 5月</p>
シャコ	東京湾では15~30mの深さにすむ。肉食性で甲殻類、多毛類等を捕らえて食べる。江戸前の寿司ネタとして重宝されるが、近年、漁獲量が少ない。	 <p>St.25 11月</p>
トリガイ	ほぼ球形で、殻は薄く脆い。長い足が鳥の嘴に見えることが名前の由来とされる。危険が迫るとこの足を激しく振り回して逃亡する。内湾の砂泥底に生息し、東京湾奥部では夏季の貧酸素水塊の発生により、ほとんどが死亡する。	 <p>St.22 5月</p>
ホンビノスガイ (外来種)	殻長10cmを越える丸みを帯びた三角形の大型種。貧酸素状態等の環境悪化に耐性がある。外来種であるが、東京湾ではおなじみの貝となっている。殻の色は本来白っぽいのが、底泥中の硫化物の影響で黒っぽくなっている。	 <p>St.10 5月</p>

## 鳥類調査（本文 79 ページ）

葛西人工渚、お台場海浜公園及び森ヶ崎の鼻で年6回（5月、6月、8月、9月、1月及び2月）に調査を行いました。






※各地点の調査範囲内での鳥類の様子は3～5ページ参照

### 調査の方法

望遠鏡や双眼鏡を用いて、船上や高台から鳥の種類ごとにカウントし、その行動（休息、採餌等）についても確認を行いました。

### 鳥類調査で確認された代表種及び重要種の一例

種名	生態情報	写真
カワウ	留鳥として内陸の淡水や河川、湖沼等で最も一般的に見られる。たくみに潜水して魚類や甲殻類を捕食する。関東での繁殖はほぼ一年中であり、水辺近くの林で集団繁殖する。東京湾周辺では、第六台場や行徳鳥獣保護区等をコロニー（集団繁殖地）やねぐらとして利用している。東京湾の浅場は重要な採餌場所であり、多くの個体が採餌のために集まる。	 <p>森ヶ崎の鼻 6月</p>
スズガモ	冬鳥として内湾や河川、湖沼等に渡来するが、沿岸の海や大きい内湾、河口部に多く見られる。東京都では、餌となる魚類やアサリ、シオフキガイ等の二枚貝が豊富な葛西人工渚周辺とお台場海浜公園の海上に見られる。冬に確認される個体数は非常に多く、数千～数万羽の群れが見られることもある。東京都レッドリストでは留意種となっている。	<p>東京湾で見られるカモ類のうち、最も個体数が多い。夏季には繁殖しない個体が少数見られることもある。</p>  <p>お台場海浜公園 5月</p>
ホシハジロ	冬鳥として湖沼、池、河川、河口、内湾などに飛来する。雄の頭部と首は赤褐色、胸は黒く、体は灰色。雌は頭部から首が褐色、体は灰褐色。群れでいることが多い。水中に潜って、水生植物の茎や根、イネ科植物の種子などを食べる。甲殻類などの動物も食べる。	 <p>森ヶ崎の鼻 1月</p>



種名	生態情報	写真
ユリカモメ	<p>ごく普通に見られる、やや小型のカモメ。冬季に海岸の漁港や河口、干潟、河川等に渡来。主に昆虫や無脊椎動物、死肉等を餌とする。群れて生活し、大群になることもある。</p> <p>冬鳥であるが、夏季に少数が越夏することもある。春季と秋季の渡りの時期には、数千羽が見られることがある。</p>	<p>都民の鳥に指定されている。</p>  <p>森ヶ崎の鼻 9月</p>
アオサギ	<p>日本に生息するサギ科では最大のサギ。水辺で魚を捕える。よく茂った樹林などに他のサギ類と共に集団繁殖地(コロニー)を形成する。鳴き声、フンの問題で近隣住民とトラブルになり、追いつめられることが多い。第六台場、鳥の島でカワウ、コサギ、ダイサギとコロニーを形成しており、東京都内では数少ない繁殖地である。</p>	 <p>お台場海浜公園 5月</p>
コアジサシ	<p>夏鳥として湖沼、河川、砂浜等に渡来し、体長10cm位以下の小魚を餌とする。繁殖期は5～7月で、海岸や川の中州、埋立地の砂地や砂礫地で集団繁殖する。東京都では、森ヶ崎水再生センターの屋上に人工営巣地が造成されている。東京都レッドリストでは、絶滅危惧IB類に登録されている重要種である。</p>	 <p>森ヶ崎の鼻 6月</p>
カンムリカイツブリ	<p>主に冬鳥として海岸や海岸付近の湖沼、大きな河川等に渡来し、魚類や甲殻類、昆虫類等を餌とする。</p> <p>東京都では冬季に葛西人工渚周辺の海上に集中して見られる。かつては生息数が少なかったが、1993年度以降から急激に増加した。潜水して魚類や甲殻類、昆虫等を捕食する。</p> <p>東京都レッドリストでは留意種である。</p>	<p>冬羽では顔から胸が白く、首が長く体が大きいため、海上に浮いていると白く目立つ。</p>  <p>お台場海浜公園 2月</p>
ホウロクシギ	<p>旅鳥として春季と秋季に海岸の砂浜や干潟、河口の砂泥地等に渡来し、泥の中に首をねじりながら下方に湾曲した長い嘴を深く差し込み、カニ類等を捕らえる。他にゴカイ類、貝類、昆虫類等を餌とする。個体数は少ない。東京都では葛西人工渚の干潟が、主な渡来地となっている。種の保存法では国際希少野生動植物種、環境省レッドリストでは絶滅危惧Ⅱ類(VU)、東京都レッドリストでは絶滅危惧ⅠA類(CR)である。</p>	 <p>葛西人工渚 5月</p>

## 付着動物調査（本文121ページ）

付着動物とは護岸についた生き物のことを指し、その生息範囲は長期間にわたる環境の影響が反映されます。調査は、岸壁から海底まで潜水して垂直に分布状況を調べます。中央防波堤外側（その2）東側、13号地船着場で5月に年1回、付着動物の調査を実施しました。付着動物は、ムラサキガイ等の外来種が多いことが特徴的で、バラスト水との関係で水環境・生態系の問題となっています。

付着動物の死骸は海底に堆積するため、貧酸素水塊が形成される一因とも考えられています。一方、付着生物は水質の浄化にも寄与しており、東京港内護岸総延長でのCOD浄化量が、東京湾に排出される汚濁負荷量の23%に相当するとする試算結果<sup>(※2)</sup>もあります。

(※1) 東京都環境科学研究所  
木村ら 1998



## 調査地点の状況


	中央防波堤外側(その2)東側	13号地船着場
概況写真		
備考	中央防波堤外側埋立地の外側岸壁を調査地点として設定	お台場海浜公園から中央防波堤埋立地へ通じる第二航路海底トンネル排気塔にある船着場を調査地点として設定

## 付着動物調査で確認された代表種等

種名	生態情報	確認状況
イワフジツボ	【代表種】潮間帯の岩の上部に群生する小型のフジツボ。殻口は広く、周殻は単独のときには円錐形であるが、密集すると円筒形を呈する。長時間の干出によく耐える。北海道南西部以南に分布し、内湾でもかなり奥まで分布する。周殻の直径は8mmほど	 両地点とも潮間帯の上部で確認。
カタユレイボヤ	【代表種・外来種】体は半透明で、体長10cmほどになるホヤ類である。東京湾では普通に見られ、内湾域の岩礁や護岸等の基質に群生していることが多い。プランクトンを濾過して食べる。	 両地点とも潮下帯で確認。

## 底生生物調査（本文 140 ページ参照）

内湾部、浅海部及び河口部各1地点、干潟部2地点の合計5地点で年2回（5月及び8月）、底生生物の調査を実施しました。



### 内湾部（St.6）及び浅海部（三枚洲）

St.6		三枚洲	
 （現場で生体が確認できなかったため写真なし）		 	
6月 18種、347個体 下層DO 1.1mg/L	8月 1種、1個体 下層DO <0.5mg/L	6月 20種、105個体 下層DO 4.3mg/L	8月 14種、236個体 下層DO 7.4mg/L

### 河口部（St.31）及び干潟部（多摩川河口干潟）

St.31		多摩川河口干潟	
6月 20種、167個体 表層DO 7.4mg/L	8月 14種、343個体 表層DO 8.7mg/L	6月 11種、59個体 表層DO 5.5mg/L	8月 10種、58個体 表層DO 5.1mg/L

（全景及び泥の写真はいずれも6月のもの）

#### 下層 DO と表層 DO

調査対象の底生生物が生息している付近の水深の DO を併せて載せています。干潟・浅場では、夏季でも生物が生息できるほどの溶存酸素量があることが分かります。

下層 DO（海底から 1m 上）：内湾部、浅海部  
表層 DO：干潟部、河口部

# 主要な底生生物出現種


軟体動物門 腹足綱 クチキレガイ *Tiberia pulchella*

説明  
殻長15mmほど。円錐形の殻はやや厚く、灰白色から黄白色の地に赤褐色の細い線をめぐらす。潮通しの良い干潟から潮下帯のアマモ属の砂泥底に生息する。

【出現状況】

	6月	8月		6月	8月
SL6			森+崎の島		
三枚洲		●	多摩川河口干潟		
SL31					

千葉県RL 重要保護生物 (B)



軟体動物門 腹足綱 ウミゴマツボ *Stenothyra edogavensis*

説明  
殻長3mm程度になる。淡水の影響の強い内湾奥の泥干潟上の泥上に生息する。東北から九州まで分布する。(別名エドガワミゴマツボ)

【出現状況】

	6月	8月		6月	8月
SL6			森+崎の島		
三枚洲			多摩川河口干潟	●	●
SL31	●	●			

東京都RL 対象外  
千葉県RL 一般保護動物 (D)  
環境省RL 準絶滅危惧 (NT)



軟体動物門 二枚貝綱 ガタヅキ (コハギガイ) *Arthritica reikoae*

説明  
内湾奥砂泥干潟中・低潮帯の底泥に浅く埋もれて生息する。環境攪乱により東京湾奥部で爆発的に増殖したが、近年までは発見例がない。

【出現状況】

	6月	8月		6月	8月
SL6			森+崎の島	●	●
三枚洲			多摩川河口干潟	●	●
SL31					

環境省RL 情報不足 (DD)



軟体動物門 二枚貝綱 アサリ *Ruditapes philippinarum*

説明  
殻長4cmほどになる。潮干狩り等で盛んに獲られている代表的な二枚貝。東京湾のものは形が細くて、模様のコントラストが強いものが多い。

【出現状況】

	6月	8月		6月	8月
SL6			森+崎の島		
三枚洲	●	●	多摩川河口干潟		
SL31	●	●			




軟体動物門 二枚貝綱 ヤマトシジミ *Corbicula japonica*

説明  
殻長4cmほどになる。河口干潟等淡水の影響の強い、砂底から泥底に生息する。

【出現状況】

	6月	8月		6月	8月
SL6			森+崎の島		●
三枚洲			多摩川河口干潟	●	●
SL31					

東京都RB 情報不足 (DD)  
千葉県RL 重要保護生物 (B)  
環境省RL 準絶滅危惧 (NT)




軟体動物門 二枚貝綱 ソトオリガイ *Laternula (Exolaternula) marilina*

説明  
殻長50mmほどの二枚貝。殻は非常に薄く、前・後端は開口する。太く長い水管を出して、河口域近くの干潟の砂泥底にやや深く潜って生息する。

【出現状況】

	6月	8月		6月	8月
SL6			森+崎の島		
三枚洲			多摩川河口干潟		●
SL31					

千葉県RL 重要保護生物 (C)



軟体動物門 二枚貝綱 ミソガイ *Siliqua pulchella*

説明  
殻長30mmほどの二枚貝。殻は非常に薄く青紫褐色の半透明で、殻頂から腹縁にかけて強い内肋が1本ある。外洋に面した内湾の干潟の干潮線から外洋の砂浜の潮下帯に生息する。

【出現状況】

	6月	8月		6月	8月
SL6			森+崎の島		
三枚洲		●	多摩川河口干潟		
SL31					

千葉県RL 一般保護生物 (D)




環形動物門 多毛綱 マキントシコロリ *Glycera machitochi*

説明  
大きいもので体長15cmほどになる多毛類。薄皮で、4つの鋭い牙(顎)がついた物を出し、干潟の小動物を捕らえる。

【出現状況】

	6月	8月		6月	8月
SL6			森+崎の島	●	
三枚洲	●	●	多摩川河口干潟		
SL31					



環形動物門 多毛綱 シノバハネエラスピオ *Paraprionospio patiens*

説明  
ハネエラの名の通り頭部に羽状の鋸を持つ。黄酸素環境に耐性があり、有機汚濁指標種となっている。

【出現状況】

	6月	8月		6月	8月
SL6		●	森+崎の島		
三枚洲		●	多摩川河口干潟		
SL31		●			




環形動物門 多毛綱 ミズヒキゴカイ属 *Cirriformia sp.*

説明  
砂泥干潟や浅瀬の海底に潜り、水引に見立てられる細い糸のような鉤と触手を水中に伸ばしていることが多い。かなり汚れた環境でも生息していることから、有機汚濁指標とされてきたが、近年の研究で、従来1種とされてきたミズヒキゴカイが12種に分かれることが明らかになり、住む環境も一律ではないことから、一括りに有機汚濁指標として扱うことが適切ではないと指摘されている。本調査においても、ミズヒキゴカイ属として扱う。

【出現状況】

	6月	8月		6月	8月
SL6			森+崎の島		●
三枚洲			多摩川河口干潟		●
SL31		●			




節足動物門 軟甲綱 ヤマトオサガニ *Macrophthalmus (Mareotis) japonicus*

説明  
甲幅4cmほど。柔らかい水分の多い泥干潟に斜めの穴を掘って巣穴を作る。巣穴の入り口には放射状の浅い溝ができる。

【出現状況】

	6月	8月		6月	8月
SL6			森+崎の島		
三枚洲			多摩川河口干潟	●	
SL31					

東京都RL 留意種  
千葉県RL 一般保護生物 (D)



節足動物門 軟甲綱 ムロミスナウミナナフシ *Cyathura muromiensis*

説明  
体長2cmほど。細長い円筒状の体をしており、白地に褐色の斑紋がある。干潟の表層部に巣穴を掘って生活する。

【出現状況】


	6月	8月		6月	8月
SL6			森+崎の島	●	●
三枚洲			多摩川河口干潟	●	●
SL31		●			

※種魚調査において既西人工浴で出現した。



## 生き物の脅威となる「貧酸素水塊」

東京湾、とりわけ東京都内湾では、毎年、春から夏にかけて、下層に溶存酸素量（DO）の低い「貧酸素水塊」が、広範囲・長期に形成されます。この水塊は、水生生物の生育・生息を阻害する原因の一つとなっており、東京湾の水環境の大きな課題となっています。貧酸素水塊形成の要因と考えられるのは、赤潮の発生や成層の形成による上下の水の循環が起こらないことです。赤潮については、「令和6年度 東京湾調査結果報告書 ～赤潮・貧酸素水塊調査～（東京都環境局）」にて詳述しています。



一般的に、DOが4 mg/L程度から生物の生息に影響が始め、2 mg/L未満では、生物の生息が難しくなると言われています。




令和5年度における東京湾の下層DO（溶存酸素量）の平面分布  
 左：貧酸素水塊が広がる8月、中央：回復過程にある12月  
 （東京湾岸自治体環境保全会議の東京湾水質調査報告書より）

### 貧酸素水塊の影響 ～成魚調査より～

9月の調査時には、下層の溶存酸素量が低めであり、生物種類数が激減しました。一方、貧酸素水塊が形成される前の5月、解消からしばらく経った2月の調査では、多くの生物が確認されました。

5月 30種、956個体(魚類以外も含む)



9月 0種、0個体



図 St.25の採取生物種類数と下層DO

## 【参考】

東京湾再生推進会議

「東京湾再生のための行動計画（第三期）」（令和5年3月）

快適に水遊びができ、「江戸前」をはじめ多くの生物が生息する、  
親しみやすく美しい豊かな「海」を多様な主体が協力しあうことで取り戻す  
～流域 3,000 万人の心を豊かにする「東京湾」の創出～

「第9次水質総量削減の在り方について（答申）」一部抜粋（令和3年3月）

「藻場・干潟の保全・再生等を通じた水質浄化及び生物多様性・生物生産性の確保等の重要性に鑑み、地域の実情を踏まえた総合的な取組の確実に推進していくことが必要である。」

# ～赤潮（プランクトン）調査、水生生物調査の速報を発信しています～

東京都環境局 HP

東京都 水環境 東京湾

検索

([https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/tokyo\\_bay/](https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/water/tokyo_bay/))

HP では、水生生物調査、赤潮調査の速報や、過去の報告書等を掲載しています。

平成 31 年度 東京都内湾水生生物調査 5 月稚魚調査 速報

### ●実施状況

令和元年 5 月 17 日に稚魚調査を実施した。天気は晴れで、気温 21.0～24.1℃であった。調査地点は南寄りの風 1.9～4.2m であり、葛西人工渚は、他の 2 地点に比べ、風波がやや大きかった。調査当日は中潮で、干潮が 10 時 1 分、満潮は 16 時 25 分であった（気象庁のデータ）。

各地点とも、例年に比べてスズキ、マハゼは少なかつたものの、ボラの稚魚は例年と同程度採取された。

水生生物調査実施中！

稚魚調査中は、写真ののほりを掲げています。見かけた方は、お気軽にお声がけください。



## X (旧 Twitter)

水環境関連のポストをしています。



東京都 環境・自然  
@tochokankyo

QR コードは  
こちら↓



東京都 環境・自然 @tochokankyo · 2022年11月24日  
【水生生物調査で初めてコウノトリを確認！】

10月の調査において、羽田空港近くの干潟で採餌、休息するコウノトリが確認されました。コウノトリは世界で2500羽以下しかおらず、国の特別天然記念物に指定されています。本個体は足環から、2018年に播磨県で放鳥された個体とわかりました。

